


# Cómo hacer ciprofloxacino líquido

Necesitará:

- un comprimido de ciprofloxacino de 500 mg
- una cucharita de medición
- dos tazones pequeños

*En esta emergencia, no hay formas líquidas del medicamento disponibles. Para niños o adultos que no pueden tragar pastillas, siga estas instrucciones para hacer una solución líquida.*

## Paso 1



1. Vierta **4 cucharaditas de agua a temperatura ambiente** en un tazón pequeño.
2. Ponga **1 pastilla de ciprofloxacino** en un tazón.
3. Deje la pastilla **en el agua durante 5 minutos** hasta que se deshaga.
4. **Mezcle bien** hasta que el polvo se disuelva y no quede más polvo en el fondo del recipiente. Si el medicamento no se disuelve, revuelva con la cucharita cada vez que mida el medicamento.

## Paso 2



1. **Pese a su familiar.** Si no tiene una báscula, adivine su peso con base en su edad. *Es mejor adivinar el peso muy alto que muy bajo.*
2. Con la tabla de la derecha, consulte **la cantidad de mezcla que debe dar** de acuerdo con el peso.
3. Revuelva la mezcla y mida la cantidad correcta. Ponga la cantidad medida en el segundo tazón.
4. El medicamento es amargo y debe mezclarse con un alimento o una bebida.



1 dosis



- Para bebés:
  - **Mezcle 1 o 2 cucharaditas de agua o de jugo de manzana** en el segundo tazón y póngalo en una botella. **NO** lo mezcle con fórmula, leche materna o productos lácteos.
- Para niños mayores o adultos:
  - **Mezcle el medicamento con un alimento o bebida dulce**, como jarabe de chocolate, azúcar de mesa o jugo de manzana o puré de manzana con azúcar añadida.
  - **NO** mezcle con jugo fortificado con calcio, fórmula, leche materna o leche, ni con cualquier producto lácteo, como yogur o helado.

Líquido de ciprofloxacino para administración oral 125 mg por cada 5 ml (por cucharadita)	
Peso (libras)	Dosis
Menos de 7 lbs	¼ de cucharadita
De 7 a 9 lbs	½ cucharadita
Más de 9 lbs y hasta 13 lbs	¾ de cucharadita
Más de 13 lbs y hasta 18 lbs	1 cucharadita
Más de 18 lbs y hasta 26 lbs	1½ cucharadita
Más de 26 lbs y hasta 36 lbs	2 cucharaditas
Más de 36 lbs y hasta 42 lbs	2½ cucharaditas
Más de 42 lbs y hasta 48 lbs	3 cucharaditas
Más de 48 lbs y hasta 55 lbs	3½ cucharaditas
Más de 55 lbs	4 cucharaditas

Dosis aplicable para la profilaxis contra el ántrax, la plaga o la tularemia. El rango de la dosis para pacientes de 7 a 55 lbs es de 15.3 mg/kg/dosis a 22.8 mg/kg/dosis (el promedio es de 18.2 mg/kg/dosis). El rango de la dosis para bebés que pesan menos de 7 lbs es de 10 a 15 mg/kg/dosis.

## Paso 3

1. **Administre esta dosis dos veces al día**, una en la mañana y otra en la tarde, durante los días que le indicaron que administrara este medicamento. Asegúrese de siempre revolver la mezcla del medicamento antes de medirla.
2. **IMPORTANTE:** Administre este medicamento 1 hora antes o 2 horas después de que el niño o el adulto haya consumido cualquiera de los siguientes:
  - fórmula para bebés, leche materna, leche o productos lácteos, como yogur, pudín o helado
  - jugo fortificado con calcio
  - vitaminas, hierro, antiácidos, suplementos de zinc o sucralfato (un medicamento)
3. Puede **usar esta mezcla del medicamento hasta por 24 horas** si permanece cubierto o se almacena a temperatura ambiente o en el refrigerador. Tire la mezcla que sobre después de 24 horas y prepare una nueva.



El nombre de mi familiar: \_\_\_\_\_

La dosis de mi familiar: \_\_\_\_\_

**Si tiene alguna pregunta, llame a CO-HELP al 1-877-462-2911.**