

Cómo hacer doxiciclina líquida


Necesitará:

- una pastilla de doxiciclina de 100 mg
- algo pesado para moler la pastilla
- una cucharita de medición
- dos tazones pequeños

En esta emergencia, no hay formas líquidas del

medicamento disponibles. Para niños o adultos que no pueden tragar pastillas, siga estas instrucciones para hacer una solución líquida.

Paso 1



1. Ponga 1 pastilla de doxiciclina en un tazón pequeño.
2. Aplaste la pastilla hasta hacerla polvo con una cuchara o el fondo de un vaso. Aplástela hasta que ya no queden pedazos grandes del medicamento en el polvo.
3. Mezcle 4 cucharaditas de agua con el polvo.
4. Mezcle bien hasta que el polvo se disuelva y no quede más polvo en el fondo del tazón.

Paso 2



1. **Pese a su familiar.** Si no tiene una báscula, adivine su peso con base en su edad. *Es mejor adivinar el peso muy alto que muy bajo.*
2. Con la tabla de la derecha, consulte **la cantidad de mezcla que debe dar** de acuerdo con el peso.
3. Revuelva la mezcla y mida la cantidad correcta. Ponga la cantidad medida en el segundo tazón.
4. El medicamento es amargo y debe mezclarse con un alimento o una bebida.

- Para bebés:
 - **Mezcle 1 o 2 cucharaditas de agua o de jugo de manzana** en el tazón y póngalo en una botella.
- Para niños mayores o adultos:
 - **Mezcle el medicamento con un alimento o una bebida dulce.** Los alimentos y las bebidas con chocolate son la mejor opción. También puede usar azúcar de mesa con agua, jugo de manzana o puré de manzana con azúcar añadida.
 - También puede hacer que su hijo chupe un cubo de hielo o una paleta antes y después de tomar el medicamento para ayudar a esconder el mal sabor.

Líquido de doxiciclina para administración oral 25 mg por cada 5 ml (por cucharadita)	
Peso (libras)	Dosis
Menos de 7 lbs	¼ de cucharadita
De 7 a 12 lbs	½ cucharadita
Más de 12 lbs y hasta 19 lbs	¾ de cucharadita
Más de 19 lbs y hasta 25 lbs	1 cucharadita
Más de 25 lbs y hasta 37 lbs	1½ cucharaditas
Más de 37 lbs y hasta 50 lbs	2 cucharaditas
Más de 50 lbs y hasta 62 lbs	2½ cucharaditas
Más de 62 lbs y hasta 75 lbs	3 cucharaditas
Más de 75 lbs y hasta 87 lbs	3½ cucharaditas
Más de 87 lbs	4 cucharaditas

Mezcle bien antes de usarla.



Paso 3

1. **Administre esta dosis dos veces al día**, una en la mañana y otra en la tarde, durante los días que le indicaron que administrara este medicamento.
2. **IMPORTANTE:** Administre este medicamento 1 hora antes o 2 horas después de que el niño o el adulto haya consumido cualquiera de los siguientes:
 - fórmula para bebés, leche materna, leche o productos lácteos, como yogur, pudín o helado
 - jugo fortificado con calcio
 - vitaminas, hierro, antiácidos, suplementos de zinc o sucralfato (un medicamento)
3. Puede **usar esta mezcla del medicamento hasta por 24 horas** si permanece cubierto o se almacena a temperatura ambiente o en el refrigerador. Tire la mezcla que sobre después de 24 horas y prepare una mezcla nueva.



El nombre de mi familiar: _____

La dosis de mi familiar: _____

Si tiene alguna pregunta, llame a CO-HELP al 1-877-462-2911.