

Ciprofloxacino

(ciprofloxacino)



Spanish
Cipro
Anthrax

Está tomando el antibiótico **ciprofloxacino** (“cipro”) para tratar una posible exposición al **ántrax**.

- Sarpullido o ronchas

Comience a tomar este medicamento inmediatamente después de abandonar el centro de medicamentos.

Siga las instrucciones

- **Tome todo el medicamento según le han indicado incluso si se siente bien.**
- Tome este medicamento con un vaso lleno de agua. Beba varios vasos todos los días mientras esté tomando este medicamento.
- Si el medicamento le provoca molestias de estómago, tómelo con alimentos (pero no con leche, yogurt o queso).
- Si se salta una dosis:
 - Tome la dosis que se ha saltado lo más pronto posible.
 - Si es casi la hora de tomar la siguiente dosis, sátese la dosis perdida y tome la siguiente dosis a la hora programada.
 - **No tome dos dosis al mismo tiempo.**

Información las 24 horas

Línea de Atención Directa:

(your phone number)

Retransmisión para personas con impedimentos auditivos:

Sitios de Internet:

(your Web address)

Advertencia

Si está embarazada, cabe la posibilidad de que esté embarazada, está dando el pecho a un bebé o tiene epilepsia o enfermedad del riñón, informe a los trabajadores de atención a la salud antes de tomar este medicamento.

No tome este medicamento si ha tenido una reacción alérgica a los medicamentos ciprofloxacino u otras quinolonas como norfloxacino (Noroxin), ofloxacino (Floxin), levofloxacino (Levaquin) o gatifloxacino (Tequin).

Este medicamento aumenta las posibilidades de quemaduras solares; use protector solar.

El ciprofloxacino puede hacerle sentir mareos. No conduzca ni use maquinaria hasta que no sepa cómo le afectará.

Obtenga atención médica inmediatamente si tiene cualquiera de estos signos

Acerca del ántrax

- Respiración sibilante (pitidos) o dificultad respiratoria
- Hinchazón de la cara, los labios o la garganta
- Diarrea grave
- Convulsiones

Informe a un profesional de atención a la salud si tiene: náuseas, diarrea leve, molestias de estómago, dolor en las articulaciones, mareo o dolor de cabeza.

Vigile los signos del ántrax

Vaya a un hospital inmediatamente si tiene:

Fiebre
Esc
alofríos Tos
Dolor de cabeza
Deb
ilidad
Molestias en el pecho
Dificultad para respirar
Úlceras o ampollas en la piel que se vuelven negras
Inflamación de las glándulas linfáticas
Náuseas graves, vómitos, dolores de estómago

Medicamentos y alimentos que debe evitar

No tome estos medicamentos en las dos horas siguientes de haber tomado ciprofloxacino:

antiácidos (Tums o Maalox), suplementos de hierro o zinc, vitaminas o sucralfatos (Carafate),
Usted puede tomarlos dos horas después o seis horas antes del ciprofloxacino. Si toma medicamento para el asma como teofilina o un

anticoagulante como Coumadin, informe a su profesional de atención a la salud.

No beba más de dos bebidas cafeinadas (café, té, refresco) por día. No tome ciprofloxacino con alimentos que tengan grandes cantidades de calcio (leche, yogurt, queso).

Podría necesitar más medicamento

Consulte regularmente la radio, la televisión, un periódico o Internet para informarse si necesita un suministro adicional y dónde conseguirlo.

NOT FOR USE / MUESTRA, NO PARA EL USO

Acerca del ántrax

El ántrax está causado por bacterias que forman esporas. Las esporas causan la infección cuando entran en el cuerpo a través de la piel o la boca o al inhalarlas.

El ántrax no se contagia de una persona a otra.

Un acto de bioterrorismo podría incluir la liberación intencional de ántrax al aire.

Síntomas del ántrax

Los síntomas usualmente aparecen dentro de uno a siete días después de la exposición, pero pueden tardar hasta 60 días en desarrollarse.

Los síntomas dependen de cómo se haya expuesto la persona a las esporas del ántrax: a través de la boca, por inhalación o a través del contacto con la piel.

■ **Por inhalación** (ántrax pulmonar). Los casos más graves de ántrax se producen cuando las esporas entran en los pulmones por inhalación. Los primeros síntomas son parecidos a los de la gripe o resfrío común, inclusive con fiebre, tos, dolor de cabeza, escalofríos, debilidad, dificultad para respirar y malestar en el pecho. Después de algunos días, los síntomas pueden degenerar en problemas severos de respiración y shock. Este tipo de infección con ántrax es con frecuencia fatal, si es que no

se lo atiende rápidamente.

■ **A través de la piel** (ántrax cutáneo). Cuando la bacteria del ántrax entra en el cuerpo a través de un corte o raspadura en la piel, los primeros síntomas incluyen un bulto con comezón y posteriormente aparece una ampolla pequeña que cambia a una herida sin dolor con un centro negro. También se pueden hinchar las glándulas linfáticas.

■ **A través de la boca** (ántrax gastrointestinal). Cuando se ingiere la bacteria del ántrax, infecta el estómago y los intestinos. Los primeros síntomas incluyen náuseas, vómitos, pérdida del apetito y fiebre, seguido por dolor abdominal, vómitos de sangre y diarrea severa.

Si tiene síntomas, consulte con un proveedor de atención a la salud.

Tratamiento del ántrax

Los antibióticos se usan para prevenir o tratar infecciones en personas expuestas al ántrax.

La prevención temprana y el tratamiento inmediato pueden salvarle la vida.

Sea inteligente, tome su medicamento

Tomar el medicamento que le han dado, incluso si no se siente enfermo, es lo mejor que puede hacer para su salud y seguridad ahora mismo.

- Los antibióticos son eficaces para prevenir el ántrax.
- Su familia y sus amigos confían en que usted se mantenga sano.

Cúidese

- Descanse mucho.
- Manténgase físicamente activo.
- Coma alimentos saludables. Dé a su cuerpo lo que necesita.
- Permanezca en contacto con la familia y los amigos para recibir apoyo.
- Siga las instrucciones para tomar su medicamento