

Doxiciclina



Spanish
Doxycycline
Anthrax

Información las 24 horas

Línea de Atención Directa:

(your phone number)

Retransmisión para personas con impedimentos auditivos:

Sitios de Internet:

(your Web address)

Está tomando el antibiótico **doxiciclina** para tratar una posible exposición al **ántrax**.

Comience a tomar este medicamento inmediatamente después de abandonar el centro de medicamentos.

Siga las instrucciones

- **Tome todo el medicamento según le han indicado incluso si se siente bien.**
- Puede tomar el medicamento con alimentos (pero no con leche) para prevenir las molestias de estómago.
- Si se salta una dosis:
 - Tome la dosis que se ha saltado lo más pronto posible.
 - Si es casi la hora de tomar la siguiente dosis, sátese la dosis perdida y tome la siguiente dosis a la hora programada.
 - **No tome dos dosis al mismo tiempo.**

Advertencia

Si tiene una enfermedad de hígado, está embarazada, cabe la posibilidad de que esté embarazada o está dando el pecho a un bebé, informe a los trabajadores de atención a la salud antes de tomar este medicamento.

No tome este medicamento si ha tenido una reacción alérgica a los antibióticos tetracíclicos.

Las **píldoras anticonceptivas** puede que no funcionen tan bien mientras esté tomando doxiciclina. Use otro método anticonceptivo adicional, como un preservativo, mientras esté tomando este medicamento.

Este medicamento aumenta las posibilidades de quemaduras solares; use protector solar.

Las mujeres pueden desarrollar infecciones vaginales por levaduras al tomar este medicamento.

Medicamentos y suplementos que debe evitar

No tome antiácidos, como Maalox, Mylanta o Tums, suplementos de calcio o hierro, colestiramina (Questran) o colestipol (Colestid) en las dos horas siguientes de tomar doxiciclina.

Obtenga atención médica inmediatamente si tiene cualquiera de estos síntomas

- Sarpullido, ronchas o picazón
- Respiración sibilante (pitidos) o dificultad respiratoria
- Hinchazón de la cara, los labios o la garganta

Estos síntomas pueden estar causados por una reacción alérgica a la doxiciclina.

Informe a su profesional médico si ha presentado alguno de estos efectos secundarios menos serios: náuseas, diarrea leve, molestias de estómago, dolor de garganta, úlceras en la boca, sensibilidad a la luz del sol o picazón en la boca o en la vagina durante más de dos días.

Vigile los signos del ántrax Vaya a un hospital inmediatamente si tiene:

Fiebre Molestias en el pecho

Dolor de cabeza Escalofríos

Debilidad Tos

Dificultad para respirar

Úlceras o ampollas en la piel que se vuelven negras

Inflamación de las glándulas linfáticas

Náuseas graves, vómitos, dolores de estómago

Podría necesitar más medicamento

Consulte regularmente la radio, la televisión, un periódico o Internet para informarse si necesita un suministro adicional. Si necesita tomar más medicamento, le diremos cómo conseguirlo.

Acerca del ántrax

El ántrax está causado por bacterias que forman esporas. Las esporas causan la infección cuando entran en el cuerpo a través de la piel o la boca o al inhalarlas.

El ántrax no se contagia de una persona a otra.

Un acto de bioterrorismo podría incluir la liberación intencional de ántrax al aire.

Síntomas del ántrax

Los síntomas usualmente aparecen dentro de uno a siete días después de la exposición, pero pueden tardar hasta 60 días en desarrollarse.

Los síntomas dependen de cómo se haya expuesto la persona a las esporas del ántrax: a través de la boca, por inhalación o a través del contacto con la piel.

■ **Por inhalación** (ántrax pulmonar). Los casos más graves de ántrax se producen cuando las esporas entran en los pulmones por inhalación. Los primeros síntomas son parecidos a los de la gripe o resfrío común, inclusive con fiebre, tos, dolor de cabeza, escalofríos, debilidad, dificultad para respirar y malestar en el pecho. Después de

algunos días, los síntomas pueden degenerar en problemas severos de respiración y shock. Este tipo de infección con ántrax es con frecuencia fatal, si es que no se lo atiende rápidamente.

■ **A través de la piel** (ántrax cutáneo). Cuando la bacteria del ántrax entra en el cuerpo a través de un corte o raspadura en la piel, los primeros síntomas incluyen un bulto con comezón y posteriormente aparece una ampolla pequeña que cambia a una herida sin dolor con un centro negro. También se pueden hinchar las glándulas linfáticas.

■ **A través de la boca** (ántrax gastrointestinal). Cuando se ingiere la bacteria del ántrax, infecta el estómago y los intestinos. Los primeros síntomas incluyen náuseas, vómitos, pérdida del apetito y fiebre, seguido por dolor abdominal, vómitos de sangre y diarrea severa.

Si tiene síntomas, consulte con un proveedor de atención a la salud.

Tratamiento del ántrax

Los antibióticos se usan para prevenir o tratar infecciones en personas expuestas al ántrax.

La prevención temprana y el tratamiento inmediato pueden salvarle la vida.

Sea inteligente, tome su medicamento

Tomar el medicamento que le han dado, incluso si no se siente enfermo, es lo mejor que puede hacer para su salud y seguridad ahora mismo.

- Los antibióticos son eficaces para prevenir el ántrax.
- Su familia y sus amigos confían en que usted se mantenga sano.

Cúidese

- Descanse mucho.
- Manténgase físicamente activo.
- Coma alimentos saludables. Dé a su cuerpo lo que necesita.
- Permanezca en contacto con la familia y los amigos para recibir apoyo.
- Siga las instrucciones para tomar su medicamento.